

## Тема 6.1. ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ У ПТИЦІ

1. Запалення вола.
2. Закупорка вола.
3. Стоматит гусей

### 1. Запалення вола.

**Запалення вола** – зустрічається у курей, індиків, цесарок і голубів. Хворіє доросла птиця різного віку.

**Етіологія.** Захворювання виникає внаслідок поїдання недоброякісних кормів, мінеральних добрив і отрутохімікатів.

**Симптоми.** Птиця пригнічена, апетит знижений. Вола м'якої консистенції, містить гази. При пальпації із дзьоба виділяється рідкий вміст з неприємним запахом.

**Патолого-анатомічні зміни.** Вміст вола рідкий, пінявий, зі слизом, має гнильний запах. Виявляють катар слизової оболонки вола. Частіше у волі знаходять світло-сірий наліт, є нашарування фібрину, що легко відділяється.

**Діагноз** ставлять на основі анамнезу, симптомів хвороби, патолого-анатомічних змін. За необхідності проводять хіміко-токсикологічні дослідження корму або вмісту вола. Виключають ньюкаслську хворобу, пастерельоз, пулороз.

**Лікування.** Виключають з раціону недоброякісні корми, вводять слизові відвари. Замість води випоюють слабкі дезінфекційні розчини: 0,2 % розчин соляної, 0,3 % – молочної кислоти або натрію саліциловокислого, 0,02 % розчин калію марганцевокислого. Вола промивають 1 % розчином натрію саліциловокислого, 5 % розчином натрію гідрокарбонату, 0,05 % розчином калію марганцевокислого.

**Профілактика.** Не можна згодовувати птиці недоброякісні корми. Під вигули відводять місця, розташовані на достатній відстані від складів мінеральних добрив і отрутохімікатів. Годівниці слід щоденно промивати і один раз на тиждень дезінфікувати. Вода має бути постійно свіжою.

## 2. Закупорка вола

**Закупорка вола** – (атонія вола, розширення вола, тверде вола) характеризується переповненням вола кормовими масами, зниженням тонусу його мускулатури і розвитком непрохідності.

**Етіологія.** Годівля птиці сухими, борошністими кормами при нестачі соковитих кормів і води, а також тривалі перерви в годівлі з наступним даванням сухих кормів у великих кількостях. Сприяє розвитку хвороби нестача в раціоні вітамінних і мінеральних речовин.

**Симптоми.** Симптоми хвороби проявляються через декілька годин після годівлі. Птиця пригнічена, вола збільшене, щільної або тістоподібної консистенції, часто відвисає. Закупорення вола ускладнюється запаленням слизової оболонки.

**Діагноз** ставлять на основі симптомів.

**Лікування.** Рекомендується вводити дорослій птиці 20-30 мл олії, розминати і видаляти вміст вола через рот. Якщо це не вдається, то проводять хірургічне втручання.

**Профілактика.** Слід дотримувати технології приготування кормів, режиму годівлі, постійно забезпечувати птицю питною водою. При клітковому утриманні в раціон необхідно вводити соковиті корми.

## 3. Стomatит гусей

**Стomatит гусей** (*Stomatitis amesum*). Характеризується запаленням слизової оболонки і розтягуванням дна ротової порожнини з наступним випаданням в утворений дивертикул міжщелепового простору язика (“провалений”, “запалений” язик ). Більш сприйнятливі старі гуси, що мають у ділянці міжщелепового простору підшкірну складку – “гаманець” (холмогорські, тулузькі, китайські та їх помісі).

**Етіологія.** Частіше хворіють гуси, у раціоні яких не вистачає фосфору, кальцію, вітамінів А і групи В. Сприяє захворюванню антисанітарне утримання птиці, відсутність вигулів. Певне значення мають спадкові фактори і

близькородинне схрещування.

**Симптоми.** Хвороба перебігає хронічно. У хворих знижений апетит і вгодованість. При огляді спочатку виявляється почервоніння, припухлість і болючість слизової оболонки дна ротової порожнини. Поступово дно ротової порожнини в ділянці міжщелепового простору під тиском язика розтягується. В утворений дивертикул потрапляють кормові маси, в яких розвиваються гнильні процеси з наступним запаленням ротової порожнини і язика. Хвора птиця погано приймає корм, худне, у неї розвиваються ентероколіти, припиняється яйцекладка.

**Діагноз.** Ставлять на основі характерних симптомів хвороби.

**Лікування.** Старих і малоцінних гусей вибраковуюють. Ротову порожнину промивають 0,1 %-ним розчином калію марганцевокислого, змазують дно ротової порожнини 5 % емульсією стрептоциду, йодогліцерином (1 мл 5 % спиртового розчину йоду на 10 мл гліцерину). При утворенні дивертикулів у цінних і племінних гусей можна провести хірургічне лікування.

**Профілактика** полягає у забезпеченні птиці соковитими кормами. Не можна згодовувати гусям сухі корми, які містять остюки.

### **Література:**

1. Судаков М.О., Цвіліховський М.І., Береза В.І. та ін. Внутрішні незаразні хвороби с/г тварин / За ред. М.О. Судакова. – К.: Мета, 2002. – 352 с. (ст. 304–305)
2. Левченко В.І., Кондрахін І.П., Судаков М.О. та ін. Внутрішні хвороби тварин / За ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2001. – Ч. 2 – 544 с. (ст. 429–431)